


Infekcija uzrokovana respiratornim sincicijskim virusom - RSV infekcija



RSV je uobičajeni **uzročnik prehlade i kašlja** u djece i odraslih



većina slučajeva se pojavljuje **u zimskim mjesecima** (sporadično tokom cijele godine)



RSV se **prenosi kapljičnim putem** i kontaktom sa zaraženom osobom

4

RSV na površinama (igračke, stol) može preživjeti **4 do 7 sati**

7



period od kontakta s virusom do pojave prvih znakova bolesti je **3 do 5 dana**


u većine uzrokuje **blagu bolest dišnih puteva**

Najčešći simptomi bolesti:



curenje i/ili začepljenost


nosa




kihanje

smanjen apetit

kašalj



povišena temperatura



liječenje je simptomatsko (snižavati povišenu temperaturu, djetetu dati puno tekućine)

!!! Kada se javiti vašem pedijatru? - kada *dijete teško diše, odbija piti tekućinu ili mu se simptomi pogoršavaju*



RSV je **najčešći uzročnik upale pluća i bronhiolitisa** u djece do godinu dana

Moguće je ponovno se zaraziti i nakon preboljenja RSV infekcije. Većinom su simptomi lagani poput prehlade, ali mogu biti ozbiljni u starijih osoba ili u djece s kroničnim bolestima.

Za sada ne postoji cjepivo protiv RSV-a

Kako zaštiti svoje dijete?



Izbjegavajte druženja vašeg djeteta s djecom koja imaju simptome akutne respiratorne bolesti




Učite djecu da Peru ruke


SAPUNOM i VODOM u trajanju od najmanje 20 sekundi



Učite djecu da laktom ili maramicom pokriju nos i usta prilikom kihanja kako bi smanjili širenje virusa



Naučite djecu da izbjegavaju diranje lica prljavim rukama



Redovito čistite i dezinficirajte površine u kućanstvu



Neka vaše dijete ostane kod kuće ukoliko razvije simptome akutne respiratorne bolesti kako bismo spriječili daljnje širenje bolesti